
review

-

-

-

Sintesi della raccomandazione di vaccinazione nell'autunno 2022 per le persone vaccinate ≥ 16 anni

Gruppo target	Stato vaccinale	Numero di dosi di vaccino secondo la raccomandazione nell'autunno 22 ¹	Vaccino ²	
			Nome	Dosaggio
PPR (persone con malattie croniche, ≥ 65 anni, trisomia 21, donne incinte ³) a partire da 16 anni	Vaccinato ⁴	1 Grado di raccomandazione: +++	Comirnaty [®] Bivalent Original/Omicron BA.1 ⁵	30 µg
			Spikevax [®] Bivalent Original/Omicron ²	50 µg
			Nuvaxovid [®] ² eccetto le donne in gravidanza/allattamento ³	5 µg
			Comirnaty [®]	30 µg
			Spikevax [®]	50 µg
Personale sanitario ≥ 16 anni, persone che assistono PPR	Vaccinato	1 Grado di raccomandazione: ++	Comirnaty [®] Bivalent Original/Omicron BA.1 ⁵	30 µg
			Spikevax [®] Bivalent Original/Omicron ²	50 µg
			Nuvaxovid [®] ² eccetto le donne in gravidanza/allattamento ³	5 µg
			Comirnaty [®]	30 µg
			Spikevax [®]	50 µg
Popolazione generale 16-64 anni	Vaccinato	1 Grado di raccomandazione: (+)	Comirnaty [®] Bivalent Original/Omicron BA.1 ⁵	30 µg
			Spikevax [®] Bivalent Original/Omicron ²	50 µg
			Nuvaxovid [®] ² eccetto le donne in gravidanza/allattamento ³	5 µg
			Comirnaty [®]	30 µg
			Spikevax [®]	50 µg

Sintesi della raccomandazione di vaccinazione nell'autunno 2022 per le persone non ancora vaccinate ≥ 16 anni

Gruppo target	Stato vaccinale	Numero di dosi di vaccino secondo la raccomandazione nell'autunno 22 ¹	Vaccino	
			Nome	Dosaggio
PPR (persone con malattie croniche, ≥ 65 anni, trisomia 21, donne incinte ³) a partire da 16 anni	Non vaccinato	2 a distanza di almeno 4 settimane	Comirnaty [®] ⁵	2 x 30 µg
			Nuvaxovid [®] eccetto le donne in gravidanza/allattamento ³	2 x 5 µg
			Spikevax [®] ^{5, 7}	2 x 100 µg
Popolazione generale 16-64 anni incl. personale sanitario ≥ 16 anni, persone che assistono PPR	Non vaccinato	1	Comirnaty [®] Bivalent Original/Omicron BA.1 ⁵	30 µg
			Spikevax [®] Bivalent Original/Omicron	50 µg
			Nuvaxovid [®] eccetto le donne in gravidanza/allattamento ³	5 µg
			Comirnaty [®]	30 µg
			Spikevax [®]	50 µg
	Non vaccinato	In alternativa: 2 a distanza di almeno 4 settimane	Comirnaty [®] ⁵	2 x 30 µg
Nuvaxovid [®] eccetto le donne in gravidanza/allattamento ³	2 x 5 µg			
Spikevax [®] ^{5, 7}	2 x 100 µg			

¹ Per la vaccinazione di richiamo nell'autunno 2022 occorre rispettare in ogni caso un intervallo minimo di 4 mesi dall'ultima dose di vaccino o da un'eventuale infezione.

² Se disponibile, alle persone ≥ 16 anni già vaccinate si raccomanda di effettuare la vaccinazione di richiamo nell'autunno 2022 di preferenza con un vaccino a mRNA bivalente o con Nuvaxovid[®]. Sia questi vaccini sia i vaccini mRNA monovalenti sono sostanzialmente adatti e raccomandati per prevenire infezioni gravi.

³ Attualmente, durante la gravidanza e l'allattamento non è raccomandata la vaccinazione con Nuvaxovid[®] per via dei dati sulla sicurezza tuttora insufficienti.

⁴ È raccomandata una vaccinazione nell'autunno 2022 anche alle persone a cui è già stata somministrata un'ulteriore vaccinazione di richiamo.

⁵ Comirnaty[®] 30 µg monovalente secondo l'omologazione. Se non è disponibile, in alternativa si può impiegare Comirnaty[®] Bivalent Original/Omicron BA.1, si tratta tuttavia di un uso off-label.

⁶ Alle persone < 30 anni che optano per un vaccino a mRNA è raccomandato di preferenza Comirnaty[®] (a causa dell'elevato dosaggio di Spikevax[®]).

⁷ Spikevax[®] 100 µg monovalente secondo l'omologazione. Se non è disponibile, in alternativa si può impiegare Spikevax[®] Bivalent Original/Omicron (sempre 100 µg per dose), si tratta tuttavia di un uso off-label.

Caso speciale: bambini e adolescenti di 5–15 anni⁹

Gruppo target	Stato vaccinale	Numero di dosi di vaccino secondo la raccomandazione nell'autunno 22 ⁹	Vaccino	
			Nome	Dosaggio
Adolescenti 12–15 anni	Vaccinato	Nessuna vaccinazione	-	-
	Non vaccinato	Nessuna vaccinazione	-	-
		<i>In alternativa: 2 a distanza di almeno 4 settimane</i>	Comirnaty ^{® 11} Nuvaxovid [®]	2 x 30 µg 2 x 5 µg
Bambini 5–11 anni	Vaccinato	Nessuna vaccinazione	-	-
	Non vaccinato	Nessuna vaccinazione	-	-
		<i>In alternativa: 2 a distanza di almeno 4 settimane</i>	Comirnaty ^{® 10}	2 x 10 µg
Adolescenti 12–15 anni con malattie croniche	Vaccinato	Nessuna vaccinazione	-	-
	Non vaccinato	1	Comirnaty ^{® 11} Nuvaxovid [®]	30 µg 5 µg
		<i>In alternativa: 2 a distanza di almeno 4 settimane</i>	Comirnaty ^{® 11} Nuvaxovid [®]	2 x 30 µg 2 x 5 µg
Bambini 5–11 anni con malattie croniche	Vaccinato	Nessuna vaccinazione	-	-
	Non vaccinato	1	Comirnaty ^{® 10}	10 µg
		<i>In alternativa: 2 a distanza di almeno 4 settimane</i>	Comirnaty ^{® 10}	2 x 10 µg

Caso speciale: persone con grave immunodeficienza

Gruppo target	Stato vaccinale	Numero di dosi di vaccino secondo la raccomandazione nell'autunno 22 ⁹	Vaccino	
			Nome	Dosaggio
Persone con grave immunodeficienza ≥ 12 anni	Vaccinato ⁴	1	Comirnaty [®]	30 µg
			Spikevax ^{® 12}	100 µg
			Comirnaty ^{® Bivalent Original/Omicron BA.1.15}	30 µg
			Spikevax ^{® Bivalent Original/Omicron^{12,13}}	100 µg
	Non vaccinato	3 + 1	Comirnaty [®] Spikevax ^{® 12, 14}	30 µg l'una 100 µg l'una
Bambini con grave immunodeficienza 5–11 anni	Vaccinato	Nessuna vaccinazione	-	-
	Non vaccinato	2 + sierologia: In assenza di anticorpi, 3 ^a dose per l'immunizzazione di base	Comirnaty ^{® 10}	10 µg l'una

